

EC FERTİLİZER

BAKIR (Cu-Sülfat), MANGAN (Mn-Sülfat) ve ÇİNKO (Zn-Sülfat)

SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

REGARDS

GARANTİ EDİLEN İÇERİK : W/W
Suda Çözünür Bakır (Cu) : % 0.5
Suda Çözünür Mangan (Mn) : % 1.5
Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 5

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI:

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	YAPRAKTAN KULLANIM MİKTARI
Her Çeşit Fidelerde	Dikimden 1 gün önce, üstten yağmurlama şeklinde fidelere gübreleme yapılır.	10 litre suya 50 ml/ 61 g
Tüm Sera ve Örtü Altı Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar,)	Ekim ve dikimden 3 hafta sonra başlanıp, 3-4 hafta ara ile sezon sonuna kadar devam edilir.	100 litre suya 150-250 ml/ 183-305 g
Tüm Tarla Sebzeleri (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar,)	1.Çapa dönemi sonrası 1. Uygulama, devamında 20-30 gün ara 2. ve 3. uygulamalar yapılır.	Yeteri miktarda suya 70-100 ml / 86-122 g/da
Tüm Kışlık Sebzeler (Aysberg, Marul, Kıvırcık, Ispanak, Pırasa, Lahana)	1.Çapa dönemi sonrası 1. Uygulama, 30-40 gün sonra ikinci uygulama yapılır.	Yeteri miktarda suya 70-100 ml / 86-122 g/da
Kesme Çiçekçilik, Çilek	Ekim ve dikimden 3 hafta sonra başlanıp, 3-4 hafta ara ile sezon sonuna kadar devam edilir.	100 litre suya 150-250 ml/ 183-305 g
Kavun, Karpuz, Kabak,	1.Çapa dönemi sonrası 1. Uygulama, devamında 20-30 gün ara 2. ve 3. uygulamalar yapılır.	Yeteri miktarda suya 70-100 ml / 86-122 g/da
Tüm Yumrulu Bitkiler (Soğan, Sarımsak, Havuç, Turp, Şeker Pancarı)	1.Çapa dönemi sonrası 1. Uygulama, devamında 20-30 gün ara 2. ve 3. uygulamalar yapılır.	Yeteri miktarda suya 70-100 ml / 86-122 g/da
Bağlarda	1.Uygulama: Gözler açmak üzereyken 2. Uygulama: Yapraklar farekulağı gibi olduğunda 3. Uygulama çiçek öncesi 4. Uygulama: Çiçek sonrası taneler saçma büyüklüğündeyken 5. Uygulama: Hasattan hemen sonra yapılır.	100 litre suya 150-250 ml/ 183-305 g
Tüm Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Nar)	Çiçeklenme öncesi ve çiçekten çıkınca birer kez uygulanır. Devamında 45 gün ara ile hasattan hemen sonraya kadar tekrarlanır.	100 litre suya 150-250 ml/ 183-305 g
Turunçgiller, Muz, Zeytin, İncir, Antep Fıstığı, Badem, Ceviz	Çiçeklenme öncesi ve çiçekten çıkınca birer kez uygulanır. Devamında 45 gün ara ile hasattan hemen sonraya kadar tekrarlanır.	100 litre suya 150-250 ml/ 183-305 g
Fındık	1.Uygulama: Yapraklar farekulağı ebatlarına geldiğinde. 2. Uygulama 20-30 gün sonrasında yapılır. Devamında 45 gün ara ile hasattan hemen sonraya kadar devam edilir.	100 litre suya 150-250 ml/ 183-305 g

Faruk DENİZ
Şirket Vekili

REKOR GÜBRE TARIM GIDA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Ekim / İhale 10001 Sk.No:50/1 Menemen
Menemen V.D. 734 083 8232 İZMİR
Mersis No:0734083823200011

Tüm Endüstri Bitkileri (Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Tütün, Çay)	1.Çapa dönemi sonrası 1. Uygulama, devamında 20-30 gün ara 2. ve 3. uygulamalar yapılır.	Yeteri miktarda suya 70-100 ml / 86-122 g/da
Tüm Baklagiller (Nohut, Mercimek Fasulye, Soya Fasulyesi Yer Fıstığı)	1.Çapa dönemi sonrası 1. Uygulama, devamında 20-30 gün ara 2. ve 3. uygulamalar yapılır.	Yeteri miktarda suya 70-100 ml / 86-122 g/da
Tüm Tarla ve (Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf, Çavdar)	1.Uygulama: Kardeşlenme döneminden itibaren, 2. Uygulama: Gebeleşme öncesinde yapılır.	Yeteri miktarda suya 70-100 ml / 86-122 g/da
Yeşil Alan ve Yem Bitkilerinde Yonca Korunga Fiğ	Her biçimden 10-15 gün sonra	Yeteri miktarda suya 70-100 ml / 86-122 g/da

FİRMA BEYANI:

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI:

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. **Depolama sıcaklığı + 5 ila + 40 °C derece arasında olmalıdır.**

DİĞER KİMYASALLAR İLE KARIŞABİLİRLİĞİ:

Sadece böcek ilacı, kurt ilacı vb. insektisitler ile karıştırılarak uygulanabilir. Ancak uygulamadan önce kavanoz testi yapılmasını tavsiye ederiz. Yabancı ot ilaçları ile karıştırmayınız.

UYARILAR:

- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- *Kullanımdan önce çalkalayınız ve klora hassas bitkilerde gözetim altında kullanınız.
- *Çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Tahriş edicidir göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

LİSANS NO : 2275
TESCİL NO :
PARTİ/SERİ NO : Ambalajın üzerinde yazmaktadır.
ÜRETİM TARİHİ : Ambalajın üzerinde yazmaktadır.
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır
NET AĞIRLIK : 0.250-0.5-1-1.5-2-3-4-5-10-15-20-25-40 litre
0.305-0.61-1.22-1.83-2.44-3.66-4.88-6.1-12.2-18.3-24.4-30.5-48.8 kg

ÜRETİCİ FİRMA :

REKOR GÜBRE TARIM GIDA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
29 Ekim Mahallesi 10001 Sokak No: 50/1 MENEMEN/ İZMİR
Tel: 0 232 364 22 22 Fax: 0 232 335 50 E-posta: rekorgubre@gmail.com



Faruk DENİZ
Şirket Vekili

REKOR GÜBRE TARIM GIDA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
29 Ekim Mahallesi Sk.No:50/1 Menemen
Menemen/İzmir 704 003 8232 İZMİR
Mersis No:0734083823200011

DERİ VE GÖZ İLE TEMASI HALİNDE TAHRİŞ EDİCİDİR

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.